

Секция «Математика и механика»

О одном классе эволюционных уравнений и представлении их решений  
интегралами Фейнмана

*Кравцева Анна Константиновна*

*Аспирант*

*Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,*

*Механико-математический факультет, Москва, Россия*

*E-mail: anna-conf@yandex.ru*

В работе рассматривается задача Коши для эволюционного уравнения:

$$\frac{\partial}{\partial t}u(t, q) = \frac{1}{2}\Delta_{A^{-1}T(A^T)^{-1}}u(t, q) + v(Cq)u(t, q),$$
$$u(0, q) = u_0(Cq).$$

Здесь  $T$  — ядерный симметричный положительно-определённый оператор, действующий в гильбертовом пространстве  $H$ , оснащённом скалярным произведением  $(\cdot, \cdot)$ .  $v_k : H \times \dots \times H \rightarrow \mathbb{R}$  —  $k$ -линейное непрерывное симметричное отображение,  $k = 1, \dots, 2l$  ( $l \geq 2$ ).  $V_{2l}(x) = v_{2l}(x, \dots, x)$ .  $V_{2l}(x) > 0$  при  $x \neq 0$ . При этом  $r(x + y) \leq r(x) + r(y) \forall x, y \in H$ , где  $r(x) = (V_{2l}(x))^{\frac{1}{2l}}$ . Также выполнены следующие условия:  $|v_k(x_1, \dots, x_k)| \leq r(x_1) \cdot \dots \cdot r(x_k)$ ,  $v(x) = \sum_{i=1}^{2l} v_i(x, \dots, x)$ .

Пусть  $t > 0$ ,  $E = \{x \in C([0, t], H) : x(t) = 0\}$ ,  $A : H \rightarrow H$  — (вещественный) линейный ограниченный обратимый оператор.  $E_0 = \{x \in E : x(t) \in A^{-1}T^{\frac{1}{2}}H$ , п.в.  $\exists x'(\tau) \in A^{-1}T^{\frac{1}{2}}H$ , и  $\int_0^t (T^{-1}Ax'(\tau), Ax'(\tau))d\tau < +\infty\}$ ,  $\Phi = \{u_0 : H \rightarrow \mathbb{C}$ , т.ч. существует аналитическое продолжение  $\tilde{u}_0 : H^{\mathbb{C}} \rightarrow \mathbb{C}$ , и  $\exists C > 0$ ,  $\frac{1}{4\|T\|} > \varepsilon > 0 : |\tilde{u}_0(z)| \leq Ce^{\varepsilon\|z\|^2} \forall z \in H^{\mathbb{C}}\}$ .

**ТЕОРЕМА 1.** Пусть  $u_0 \in \Phi$ ,  $A, C$  — обратимые операторы из  $B(H^{\mathbb{C}})$ ,  $AC^{-1} = \lambda I + TB$ ,  $|\lambda| > \|T\|\|B\|$ . Существует аналитический путь  $\varphi(\cdot)$ , т.ч.  $\varphi(t) \notin \sigma(C)$ ,  $\varphi(0) = 0$ ,  $|\varphi(1)| > \|C\|$ . Тогда задача Коши имеет решение, которое представляется в виде интеграла Фейнмана в смысле аналитического продолжения,

$$u(t, q) = \int_E e^{-\int_0^t v(C(q+x(\tau)))d\tau} u_0(C(x(0) + q)) e^{-\frac{1}{2}\int_0^t (T^{-1}Ax'(\tau), Ax'(\tau))d\tau} dx.$$

Случай, когда вместо операторов рассматриваются комплексные числа, содержится в статье [1].

**Литература**

1. Смолянов О. Г., Шавгулидзе Е. Т. Бесконечномерные уравнения Шредингера с полиномиальными потенциалами и интегралы Фейнмана по траекториям. ДАН, 1, том 408, 2006, с. 28-33.

**Слова благодарности**

Автор благодарит профессора, д.ф.-м.н. Шавгулидзе Е. Т. за постановку задачи и руководство работой.