

**Возможности лечения хронического пиелонефрита, связанного с рефлюксом, у женщин с задержкой мочеиспускания**

**Научный руководитель – Чуканова Дарья Алексеевна**

**Сиверцева Ирина Викторовна**

*Студент (специалист)*

Российский государственный социальный университет, Москва, Россия

*E-mail: irina.siverceva.93@mail.ru*

**Введение.** Учитывая высокую распространенность обострений хронического пиелонефрита, связанного с пузырно-мочеточниковым рефлюксом, у женщин с задержкой мочеиспускания в разных возрастных категориях, важно искать эффективные методики лечения данной патологии. В последнее время особую актуальность представляет отсутствие принципиального лечения, кроме как периодической аутокатетеризации. [4]

Что отрицательно влияет на образ жизни пациенток и их психологическое состояние.

Целью данной работы является систематический анализ данных, представленных в современной литературе, описываемых методы и средства лечения обострения хронического пиелонефрита при сопутствующих патологиях мочевого пузыря связанных с задержкой мочеиспускания.

**Материалы и методы.** Был произведён ретроспективный анализ литературы по данной теме за последние 5 лет с использованием поисковых систем eLIBRARY, PubMed, Web of Science, Scopus. Рассмотрен клинический случай пациентки на базе Университетской клиники РГСУ, показывающий необходимость поиска новых методик лечения.

**Результат.** В ходе работы было выявлено, что существует множество способов лечения пиелонефрита при сопутствующих патологиях. Но при задержке мочеиспускания основной методикой ведения пациентов является поддержание и нормализация свободного мочеиспускания, для уменьшения риска возникновения везикоуретрального рефлюкса с последующим реинфицированием чашечно-лоханочной системы. [2]

В настоящее время возможна только паллиативная помощь таким пациенткам. Было выявлено, что актуальность в настоящее время только растёт, и важен поиск новых методик лечения этой патологии для пациенток, которые не имеют возможности проведения периодической катетеризации в связи с прямыми или косвенными противопоказаниями. [3]

### **Источники и литература**

- 1) Aldamanhori R, Chapple CR. Underactive bladder, detrusor underactivity, definition, symptoms, epidemiology, etiopathogenesis, and risk factors. *Curr Opin Urol.* 2017;27(3): 293-299.
- 2) Aoki Y, Brown HW, Brubaker L, Cornu JN, Daly JO, Cartwright R. Urinary incontinence in women. *Nat Rev Dis Primers.* 2017 Jul 6;3:17042. doi: 10.1038/nrdp.2017.42.
- 3) Billet, M., & Windsor, T. A. (2019). Urinary Retention. *Emergency Medicine Clinics of North America.* doi:10.1016/j.emc.2019.07.005
- 4) Hartigan, S. M., Reynolds, W. S., & Dmochowski, R. R. (2019). Detrusor underactivity in women: A current understanding. *Neurourology and Urodynamics.* doi:10.1002/nau.24147