

СИМПТОМЫ НАРУШЕНИЙ СЕКСУАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ У ЖЕНЩИН С ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Сулагаева Елизавета Андреевна

Студент (специалист)

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт фундаментальной
медицины и биологии, Кафедра фундаментальных основ клинической медицины,
Казань, Россия

E-mail: elizavetasulagaeva@yandex.ru

Актуальность. Тревожно-депрессивные расстройства являются одними из самых часто встречаемых психических заболеваний. Это неоднородная группа заболеваний, которая проявляется разнообразными симптомами. Кроме того они коррелируют со многими соматическими заболеваниями, в том числе нарушениями сексуальной сферы. Появление сексуальных дисфункций на фоне психического расстройства может отягощать течение последнего, снижает качество жизни и может усугублять социальную адаптацию. В связи с этим важной проблемой является выявление симптомов нарушения сексуальной функции у женщин с тревожно-депрессивными расстройствами.

Целью исследования является выявление симптомов нарушений сексуальных функций у женщин с тревожным и депрессивным расстройствами.

Задачи исследования.

1. Изучить доступную литературу по выбранной теме.
2. Провести экспериментально-психологическое и клиничко-анамнестическое исследование сексуальной функции у пациенток с тревожно-депрессивными расстройствами.
3. Изучить взаимосвязь симптомов тревожно-депрессивных расстройств и сексуальной дисфункции.

Материалы и методы. Выборка включает в себя женщин в возрасте от 18 до 40 лет, проходивших лечение в стационарных и амбулаторных условиях. Все пациентки дали информированное добровольное согласие на участие в исследовании. Для выявления симптомов тревожно-депрессивных расстройств были использованы шкала депрессии и шкала тревоги Бека. Оценка состояния сексуальной функции женщины с помощью опросника FSFI. Для уточнения сексуальных нарушений была разработана дополнительная анкета, отмечающая присутствие травмирующих событий, приема лекарственных препаратов и обращений к специалистам, а именно психотерапевтам, психиатрам, урологам, гинекологам.

Результаты. Исследование находится на стадии сбора информации. На данный момент была опрошена 81 женщина, медианный возраст 23 года. Далее планируется расширить выборку, что позволит сформировать более точную статистику встречаемости тревожно-депрессивных нарушений и сексуальной дисфункции, в том числе их сочетанное проявление. В дальнейшем это позволит выявить взаимосвязь вышеуказанных патологических состояний.