

## Эндемизм флоры Карчагской долины

Аскерова Углангерек Магомедовна  
Сотрудник

Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия  
E-mail: ugiana.navruzova@mail.ru

Явление эндемизма позволяет судить о степени оригинальности флоры и делать выводы флюорогенетического характера. Критерием эндемичности является приуроченность всего ареала данного вида к определенной территории [4]. Эндемичные виды Карчагской долины Дагестана широко распространены на территории Кавказской флористической провинции, насчитывают 9 эндемиков из 9 родов и 9 семейств [2,3].

### **Woodsiaceae**

1. *Woodsia fragilis* (Trev.) Moore.: высокогорье, мн., ЭК

### **Ranunculaceae**

2. *Ranunculus caucasicus* Bieb.: предг. (от средн. до субальп.), мн., ЭК

### **Tiliaceae**

3. *Tilia caucasica* Rupr.: низмен., предг. (до средн. горн.), д., ЭК

### **Crassulaceae**

4. *Sempervivum caucasicum* Rupr.ex. Boiss.: предг. (от средн. до верх. горн.), мн., ЭК

### **Rosaceae**

5. *Pyrus caucasica* Fed.: низмен., предг. (до средн. горн.) – д., ЭК

### **Fabaceae**

6. *Onobrychis Bobrovii* Grossh.: предг. (нижн. и средн. горн.) – мн, ЭВК

### **Asteraceae**

7. *Tragopogon brevirostris* var. *Podolicus* DC.: низмен., предг. (нижн. горн.) дв., ЭК

### **Lamiaceae**

8. *Salvia canescens* C. A. Mey.: предг. (от средн. до верх. горн.), мн., ЭБК

### **Hyacinthaceae**

9. *Muscari palens* Bieb.: предг. (средн. горн – верхн.) мн., ЭК

Данные эндемики представлены, в основном, травянистыми многолетниками (7 видов), двулетниками (1) и деревьями (2).

По происхождению кавказские эндемики делят на группы: кавказский, дагестанский, албанский, центральнозакавказский, иберийский [1]. К эукавказским эндемикам относятся виды, связанные с Главным водораздельным Хребтом: *Woodsia fragilis* (Trev.) Moore., *Sempervivum caucasicum* Rupr.ex. Boiss., *Ranunculus caucasicus* Bieb., *Pyrus caucasica* Fed., *Tilia caucasica* Rupr. Дагестанских эндемиков на территории Карчагской долины не встречаются. Эндемиков с албанскими, иберийскими и восточно-кавказскими корнями по 1 виду (всего 3). Данными представителями являются *Tragopogon brevirostris* var. *Podolicus* DC., *Muscari palens* Bieb. *Onobrychis Bobrovii* Grossh.

## Источники и литература

- 1) 1. Гроссгейм А.А. Определитель растений Кавказа. - М.: Советская наука, 1949. - 747с.
- 2) 2. Литвинская С.А. Флора Северного Кавказа: Атлас-определитель. – М: Фитон, 2015. – 439с.

- 3) 3. Муртазалиев Р.А. Эндемики флоры Дагестана и их приуроченность к флористическим районам. Горный ботанический сад ДНЦ РАН, РФ, г. Махачкала. 2016. - С.33-42.
- 4) 4. Толмачев А.И. Методы сравнительной флористики и проблемы флорогенеза. – Новосибирск: Наука, 1986. – 192с.